




ÚMIT

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ОНКОЛОГИЯЛЫҚ
ТОМОТЕРАПИЯ ОРТАЛЫҒЫ



Қазақстан, Астана қ.,
Абылай хан д., 42/1



Байланыс орталығы:

+7(7172) 954 484
+7 777 201 44 44
+7 702 201 94 44



tomo.kz



info@tomo.kz



tomocenter.kz



tomocenter.kz



Пациентті ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯГА (ЭГДС) дайындау

- Зерттеу қатаң түрде аш қарынға жүргізіледі! Соңғы тамақтану мен ЭГДС арасында 10-нан 12 сағатқа дейін міндетті үзіліс болуы керек.
- Сондай-ақ таңертең темекі шегуге және таблетка немесе капсула түріндегі дәрі-дәрмектерді қабылдау ұсынылмайды.
- ЭГДС алдында мыналарға рұқсат етіледі: тісті тазалау; басқа зерттеулерді орындау (мысалы, УДЗ); дәл таңертең жасауды қажет ететін инъекция жасау; ауыз қуысында сінетін дәрілерді қабылдау; процедурадан 2-4 сағат бұрын газсыз су ішуге болады.
- Егер пациент қанның ұюына әсер ететін препараттарды қабылдаса (антикоагулянты: гепарин, натрий гидроцитраты, неодикумарин, синкумар; антиагрегантты құралдар: ацетилсалациил қышқылы, дипиридамол, пентоксифиллин, тиклопидин), осы препараттарды тағайындаған дәрігермен ықтимал биопсиямен алдағы зерттеу туралы шешім туралы сұрақпен зерттеу алдында кеңесу керек.
- Процедурадан 5 күн бұрын пациент құрамында темірі бар препараттарды, белсендірілген көмірді, висмут бар препараттарды қабылдаудан бастартуы керек.
- Пациент өзімен бірге В, С гепатитіне, АИТВ инфекциясы талдауды (3 айдан аспаған); процедурадан кейін бірден ішуге болатын үздіксіз қабылданатын дәрілерді алып келуі тиіс. Сондай-ақ, егер бар болса, алдыңғы зерттеу деректерін алып келу қажет. Егер науқаста аллергия болса, ол дәрігерге бұл туралы міндетті түрде хабарлауы керек.

(!) Маңызды: эпилепсиямен ауыратын пациенттерге ЭГДС тек көктамырішлік седация жағдайында ғана рұқсат етіледі! Аритмиясы бар, миокард инфарктісі, инсультпен ауыратын науқастар бір күн бұрын кардиолог пен невропатологпен кеңесу керек. Қант диабетімен ауыратын науқастар ЭГДС-ке таңертеңгі уақытқа жазылу керек және өзімен бірге дәрі-дәрмектерді (таблеткалар, инсулин) алып келу керек. Зерттеу алдында глюкоза деңгейін міндетті түрде тексеру керек. Зерттеу алдында таңертең қандагы глюкоза деңгейін тексеру керек. Демікпесі бар науқастар өздерімен бірге ингаляторды алып келуі керек.